

පැළ තුනි කිරීම

සිටුවා සති 3 දී 6 දී පමණ එක ස්ථානයක එක පැළයක් සිටින සේ පැළ ගලවා ඉවත් කළ යුතුය.

වල් මර්ධනය

සිටුවා සති 3 දී 6 දී වල් මර්ධනය කළ යුතුයි.

ජල සම්පාදනය

පළමු සති 3 තුළ දී දින 4 කට වරක් හා පසුව දින 7 කට වරක් ජල සම්පාදනය කල යුතුයි. මල් පිපෙන හා කරල් පිරෙන අවස්ථාවේ දී ජල සම්පාදනය ඉතා වැදගත් වේ. කෙසේ වෙතත් පසේ පවතින නෙතමනය අනුව ජලය සැපයිය යුතු අවස්ථාව තීරණය කළ යුතුය.

අස්වනු හෙලීම

පිදුරු පැහැ වූ කරල් වාර කිහිපයකදී නෙලා ගත යුතුය. නෙලාගත් කරල් අවිච්චි වියලා හෝනිවල දමා ලියකින් තැඳීමෙන් බීජ වෙන්කර ගත හැක.

ගබඩා කිරීම

කරල්වලින් වෙන්කරගත් බීජ පිරිසිදු කර අවිච්චි හොඳින් වියලා ගත යුතුය. ගබඩා කර ඇති විටදී රකිල ඇල්ලාගේ හානියට ගොදුරු විය හැකි නිසා වරින් වර බීජ වියලීම කල හැක.

මැදු කන්නයේ වගා කිරීම

මහ කන්නයේ අස්වනු නෙලා ගත් පසුව නැවත යල කන්නයේ වී වගාව ආරම්භ කරන තෙක් මාස 2 - 3 ක පමණ කාලයක් තුළුරු පුරන්ව පවතී. මෙම කාලසීමාව මැදු කන්නය ලෙස හැඳින්වේ. වියළි කලාපයේ බොහෝ ප්‍රදේශවල මහ කන්නයේ අස්වනු නෙලීම පෙබරවාරි මස දී ආරම්භ වන අතර නැවත යල කන්නය සඳහා වගා කරන්නේ අප්‍රේල් මස අග දී පමණය.

තුළුරුවල රෝෂ වී ඇති නෙතමනය සහ, මෙම කාලය තුළ දී බලාපොරොත්තු විය හැකි අතරින් පතර ලැබෙන වැසි උපයෝගී කර ගනිමින් කෙටි කාලීන රකිල හෝගයක් තුළුරුවල සතුටුදායකව වගා කළ හැකි බව පෙනී ගොස් තිබේ. මෙම හෝගයේ නඩත්තුව සඳහා වැඩි මහත්සියක් දැරීම අවශ්‍ය නැත. එහි අස්වැන්න වැඩි මුදලකට ඉතා පහසුවෙන් අලෙවි කර ගත හැකිය. මෙම වගාව සඳහා හෝරා ගත යුත්තේ හොඳින් හෝ මධ්‍යස්ථ ලෙස ජලය බැසයන තුළුරු පමණි. කාන්දු වීම මගින් ජලය ලැබෙන තුළුරු ද යෝග්‍ය වේ.

දින 50 - 70 කදී පමණ කාලයක දී අස්වනු ලබා ගත හැකි කෙටි කාලීන රකිල හෝග වර්ග මැදු කන්නයේ වගාව සඳහා වඩා සුදුසුය.

වැඩි විස්තර සඳහා


ආධ්‍යයන,

කෝඟු නෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය,

මහලුල්පල්ලම්.

දුරකථන/ෆැක්ස්: 025-2249177/025-2249132

ඊ-මේල්: fmrc@silnet.lk



කාමුණ

මගාම

අපි වචමු - රට නගමු
දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය
දිරි ගැන්වීමේ
ජාතික මෙහෙයුම් 2007 - 2010



කෘෂිකම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි.

