

මුං පත්‍ර විවිධ වෛරසය පතුරුවා හරින සුදු මැස්සන් සහ පැළ මැකකන් පාලනය සඳහා නිර්දේශිත කෘෂි රසායන භාවිතය, නිසි කලට වහා කිරීම හා වල් පැළ පාලනය ඉතා වැදගත්ය.

නිරෝධන කෘෂි රසායන

බෝංචි මැස්සාගේ හානිය

බීජ පත්‍ර 2 ඇති අවස්ථාවේදී හොඳින්

රසායනික නම

ඩයඩිනෝන් 50 ඊ.සී

කාබොසල්ෆාන් 20 එස්.සී

කරල් වීදින පණුවන්ගේ හානිය

රසායනික නම

තයෝඩිකාබ් 375 එස්.සී

ක්ලෝර්ෂ්ඨඑසියුරේන් 5 ඊ.සී

එහෝෆෝන් ප්‍රොක්ස් 10 ඊ.සී



සුදු මැස්සා මර්දනය

රසායනික නම

ඉම්බික්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්. එල්

ෆිප්‍රොතිල් 5 එස්. සී



සර්කස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි රෝගය පාලනය

රසායනික නම

බීටර්ටනෝල් 300 ග්‍රෑම්/ලී. ඊ.සී

ක්ලෝරොපැලොතිල් 75%

මැන්කොසෙබ් 80%



මලකඩ රෝගය

රසායනික නම

බීටර්ටනෝල් 300 ග්‍රෑම්/ලී. ඊ.සී

ක්ලෝරොපැලොතිල් 75%

අස්වැන්න නෙලීම හත කැකිලීම

කරල් මේරීම සිදු වන විට උඹුරු කර පැහැයට හැරේ.

වගාවන්හි 80% පමණ කරල් කර පැහැ වී ඇති විට කරල්

කඩා ගැනීමෙන් අස්වනු නෙලීම කල හැක. මුං වගාවේ

අස්වනු නෙලීම වාර 2-3 කින් සම්පූර්ණ වේ. හොඳින්

වියලීමෙන් පසු කොළ මඩින යන්ත්‍රයකින් හෝ ට්‍රැක්ටරයකින්

පාහා හෝ කකුලෙන් පාහා බීජ වෙන් කිරීම කල හැක. පොලා

අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කර හත් බීජ දින 2 ක් පමණ හොඳින් අවිවේ

වියළා ගැනීම කල යුතුය.

බීජ ගබඩා කිරීම

මාෂ බෝග වලට හානි කරන ගුල්ලාගේ හානිය, කල් තබා

ගැනීමේදී පවතින උඩාන ගැටලුවයි. හොඳින් වියළා හත් බීජ

උභයයා අඬ හෝ වැලි සමඟ මිශ්‍ර කර පිරිසිදු පොලිතින් මිශ්‍ර

වල අසුරා තැබීමෙන් වැඩි කලක් ගබඩා කර තැබිය හැක.

අභාරයට ගැනීමට ගබඩා කර තබන මුං සඳහා කිසියෙක්ම

කෘෂිභාගක නොයෙදිය යුතුය. එහෙත් සිටුවීම සඳහා කල්

තබා හැන්නේ නම් ඇන්ටිබියෝටික් නම් කෘෂි රසායනිකය හොඳා

කල් තබා ගැනීම කල හැකිය.

සාමාන්‍යයෙන් අක්කරයක් වගා කිරීම සඳහා රුපියල්

15,000 පමණ වැය වන අතර මුං වගාවෙන් ලැබිය

හැකි ලද්දේ ලාභය අක්කරයකට රුපියල් 50,000

ඉක්මවයි.

වැඩි තීන්තර සඳහා:

අඛනණ

තෙන්නු ගෝඟ පර්ග්සෝන හා සංවර්ධන ආයතනය

මහලුප්පල්ලම

දුරකථන අංක: 025-2249177 / 025-2249132




Designed by: AARD VISION CENTRE, Department of Agriculture, Peradeniya.
Printed by: AARD VISION CENTRE, Peradeniya.

අපි වඩමු - ඊට නගමු

දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය දිරි ගැන්වීමේ පාඨක මෙහෙයුම 2007 - 2010

මුං වගාව



මුං වගාව

උසස් ගුණාත්මයෙන් යුත් හාකමය ප්‍රෝටීන ප්‍රභවයක් සහ විටමින් හා බිහිස් අඩංගු පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක් මෙන්ම ලදරු ආහාර නිෂ්පාදනයන්හි සංවේදකයක් ලෙසද මුං ශ්‍රී ලංකාවේ වියළි හා අතරමැදි කලාපයන්හි වර්ෂා පෝෂිත උස් බිම් වල, යල කන්නයේ කුඹුරුගබාම් වල සහ ඉපහැල්ලේ වගාව (අතරමැදි කන්නයේ) සඳහා වැදගත් වන අතිරේක ආහාර හෝභයකි.

නැංගු හන රේඛාගුණික අවගන්තා

හොදින් ජලවහනය සිදු වන වැලි සහිත ලෝම පසක් මෙන්ම යෙහෙට්ලේඬි අංශක 25-35 අතර උෂ්ණත්වයක් හා වියළි පාරිසරික තත්වය මුං වගාවට බෙහෙවින් හිතකර වේ.



වගා කළ යුතු කාලය

බීජ ප්‍රයෝගනය මල් හට ගැනීම සහ කරල් පිරීම යන අවස්ථාවන්හිදී දාංගු තෙතමනය නිරෝධාත්මක සාධකයක් වන අතර කරල් වියළීම සිදු වන විට වියළි කාලගුණයක් තිබීම වගා කාලය නිරෝධාත්මක වැදගත් වේ. ජලසම්පාදිත තත්ව යටතේ යල කන්නයේ අප්‍රේල් මස අවසන් සතියේ සිට මැයි මාසයේ පළමු දෙසතිය තෙක්ද වර්ෂාවෙන් සහිත තත්ව යටතේ දී මක්තොම්බර මාසයේදී ද අතිරේක ජල සම්පාදනය කල හැකි විට නොවැම්බර මාසයද බීජ සිටුවීමට යෝග්‍ය වේ.

මැද කන්නයේ වගා කිරීම

මහ කන්නයේ අස්වනු නෙලා හත් පසුව නැවත යල කන්නයේ වි වගාව ආරම්භ කරන තෙක් මාස 2-3ක පමණ කාලයක් කුඹුරු පුරන්ට පවතී. මෙම කාල සීමාව මැද කන්නය ලෙස හැඳින්වේ.

වියළි කලාපයේ බොහෝ ප්‍රදේශවල මහ කන්නයේ අස්වනු නොමිල පෙබරවාර මසදී ආරම්භ වන අතර නැවත යල කන්නය සඳහා වගා කරන්නේ අප්‍රේල් මස අගදී පමණය. කුඹුරුවල රේෂ වී ඇති තෙතමනය සහ මෙම කාලය තුළදී බලාපොරොත්තු විය හැකි අතරින් පතර ලැබෙන වැසි උපයෝගී කර ගනිමින් කෙටි කාලීන රකිල බෝගයක් කුඹුරුවල සතුටුදායකව වගා කළ හැකි බව පෙනී ගොස් තිබේ. මෙම බෝගයේ නඩත්තුව සඳහා වැඩි මහන්සියක් දැරීම අවශ්‍ය නැත. එහි අස්වැන්න වැඩි මුදලකට ඉතා පහසුවෙන් අලෙවි කර ගත හැකිය. මෙම වගාව සඳහා හෝටා ගත යුත්තේ හොදින් හෝ මඩසස්ට ලෙස ජලය බැසයන කුඹුරු පමණි. කාන්දු වම මගින් ජලය ලැබෙන කුඹුරු ද යෝග්‍ය වේ. දින 50-70කදී පමණ කාලයක දී අස්වනු ලබා ගත හැකි කෙටි කාලීන රකිල බෝග වර්ග මැද කන්නයේ වගාව සඳහා වඩා සුදුසුය.

මුං ප්‍රභේද අතුරින් MI - 6 මැද කන්නයේ වගාව සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය වේ.

නිර්දේශිත ප්‍රභේද හා බීජ අවගන්තාවය

මුං හෝගයේ නිර්දේශිත ප්‍රභේද 3 කි.

ප්‍රභේදය	අස්වැන්න (හෙක්. කි. ග්‍රෑම්)	දින	ගණන
එම්. අයි-5	1500	60-65	
ආර්	1600	60-65	
එම්-අයි-6	1800	55-58	

අක්කරයක බීජ අවශ්‍යතාවය කිලෝ ග්‍රෑම් 12 කි.

ගෘහභාග්‍ය සකස් කිරීම හා සිටුවීම

වල් පැළ මර්දනය කර ගත් භූමියෙහි පස හොදින් පෙරලා කැට පොඬි කර ගැනීමෙන් පසු ජලවහනය හොදින් සිදුවන ආකාරයට කාණු යෙදූ ලියදි වල හෝ නියමිත පටකරයට සකස් කර ගත් වැටි සහ කාණු බීජ සිටුවීමට යෝග්‍යය.

බීජ බැසීම හා පැළ තුනි කිරීම

ලියදි වල පේලි ආකාරයට සිටුවීමේදී පේලි අතර කෙ.මි. 30 ක් හා පැළ අතර කෙ.මි 10 ක් වන ලෙස එක් ස්ථානයක එක පැළයක් තබා ගැනීම හෝ වැටි සහ කාණු ලෙස සිටුවීමේදී වැටි අතර කෙ.මි 60 (වැටියක පේලි 2ක්) හා පැළ අතර කෙ.මි 10 ක් වන ලෙස එක් ස්ථානයක පැළ 2ක් තබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි බීජ වපුරා දින 12 ක දී පැළ තුනි කල යුතුය. අධික පැළ ගහණය රෝග හා පළිබෝධ හානි වැඩි කිරීමට හේතු වේ.

ගොහොර ගස්දීම

රකිල කුලයට අයත් හෝගයක් බැවින් මුං සඳහා එතරම් පොහොර යෙදීමක් සිදු නොකලද සාමාන්‍ය අස්වැන්නක් ලබා ගත හැක. එහෙත් දිගින් දිගටම වගා කරන කෙණ්ඩායන්හිදී සහ වැඩි අස්වැන්නක් සඳහා පොහොර යෙදීම කල යුතු වේ. බීජ වැපිරීමට පෙර පිළිවෙලින් යුරියා, සාන්දු සුපර් පොස්පේට් සහ මියුරියේට් මින් පොටෑෂ් කිලෝ ග්‍රෑම් 12, 40, 30 ලෙස අක්කරයකට යෙදිය යුතු වේ. ඉන් අනතුරුව සිටුවාදින 30 කට පසු මල් පිපීම ආරම්භයේදී යුරියා කිලෝ ග්‍රෑම් 14 ක් අක්කරයකට යෙදිය යුතු වේ.

ජල සම්පාදනය

බීජ ප්‍රයෝගනය මල් පිපීම හා කරල් පිරීම යන අවධි වලදී ජල හිඟතාවයක් නොතිබිය යුතුය. මුල් සති 3 දී දින 3-4කට වරක් හා පසුව දින 7කට වරක් ජලය යෙදීම ප්‍රමාණවත්ය. කරල් මේරීම හා වියළීම සිදු වන විට ජලසම්පාදනය සීමා කල යුතුයි.

වල් පැළ මර්දනය

හොදින් බිම් සකසා ගත් කෙණ්ඩායන්හි වල් පැළ එතරම් තර්ජනයක් නොවේ. එහෙත් සති 2 කට වරක් මතුපිට පොහොර යෙදීම දක්වා පැළ හා පේලි අතර අතින් ගැලවීම හෝ උදල ගැම මගින් වල් මර්දනය කල යුතු වේ. පත්‍ර වියන මගින් පොළොව ආවරණය වූ පසු වල් පැළ වලින් ඇති කල හැකි බලපෑම ඉතා අඩුය.

රෝග හා පළිබෝධ මර්දනය

මුං වගාවේ අස්වැන්නට වැඩි බලපෑමක් ඇති කල හැකි රෝගී තත්වයන් ලෙස මුං පත්‍ර විච්චු වෛරස් රෝගය මලකඩ රෝගය හා සර්කස්පෝරා පත්‍ර ලප වැනි දිලීර රෝගද දැක්විය හැක. ලපටි පැළ වලට ඇති වන බෝංචි මැස්සාගේ හානියත් පත්‍ර හා කරල් වීදින පත්‍රවත්තේ හානියත් ප්‍රධාන කෘමි හානි වේ.