

24ල වැක්කන්

විශේෂ ලක්ෂණ

- පත්‍ර වලින් යුෂ උරා බීම නිසා පත්‍ර වල සුදු පාට පැල්ලම් ඇතිවේ
- අංකුර මැටියාවේ වසිරිස් රෝගයේ වාහකයා ලෙස ක්‍රියා කරයි



24ල වැක්කන්



හානිය

වේයන්



වේයන්

හානිය

කඳු හා මුල පද්ධතියට ඇතුළු වී හානි කරයි
කරල් වල සිදුරු සාදා බීජ හා දැමයි



හානිය

කන්‍යා (Anisolabis stali)



32ලැබීම

බීජවර්

හානිය

ශිශුවන් සහ සුනඛුලන් ලපටි කරල් වලට හානි කර බීජ හා දැමයි. හානි කල කරල් වලට ද්විතියිකව දැලිර ආසාදනය වේ



හානිය

තල වඟාවේ ජලවෝධ

24හු දැල් බදුන්තා (Antigastra catalaunalis)

විශේෂ ලක්ෂණ

- සුනඛුල තැඹිලි පැහැයට හුරු දුඹුරු පැහැති සැලබෙයෙකි
- ලපටි කිරිසින් සුදු පැහැතිය. වැඩුණු කිරිසින් කොළ පැහැති වන අතර කළු ලප සහිතය

හානිය

- ගාකයේ වර්ධක ස්ථානයේ පත්‍ර එකතු කර දැලක් බද්දි
- මල් හා අංකුර වල කිරිසින් විසින් හානිකරන ලද සිදුරු දැකිය හැකිය

24ලතාය

ඇසිසේට් 75% එස්.පී. 1 කි.ග්‍රෑ/හෙක්.

විමසීම් : අධ්‍යයන

සෞඛ්‍ය සේවා දිස්ත්‍රික්ක හා සංවර්ධන අංශය
වනජීවී විද්‍යාලය
දිස්ත්‍රික්ක අංකය : 025-2249177
025-2249172

අසි වචුල් රට නැඟුල්

දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය දිරි ගැන්වීමේ ජාතික මෙහෙයුම් 2007-2010

නෙල්

නෙල්ගවල

ජලවෝධ



ඊට කපු වගාවේ අලිබෝධ

ඊතු කේශඵ දළඹුවා (*Amsacta albistriga*)

විශේෂ ලක්ෂණ

- දුඹුරු පැහැයට හුරු සුදු පාට සලබයෙකි පියාපත් දිගහැරිය විට මි.මි. 40-50ක් පමණ විශාලය
- ලෙටි කිරිසින් ම දුඹුරු පාට වන අතර, සම්පූර්ණයෙන් වැඩුණු විට ඊතු පැහැයක් ගනී



කීටයා



පුඹුවා

හානිය

කිරිසින් විසින් පත්‍ර ආහාරයට ගනී

පාලනය

- දළඹුවන් හා බීත්තර එකතුකර විනාශ කිරීම
- ඊතයෙහික පාලනය සඳහා කාබොසල්ෆාන් කෘමිනාශකය භාවිතය

පත්‍ර කන දළඹුවන්

(*Spodoptera litura*)

විශේෂ ලක්ෂණ

- සුනඹුලා දුඹුරු පාටය. බීත්තර සමූහ වශයෙන් පත්‍ර මත දැමයි
- ලෙටි කිරිසින් ම කොළ පාට වන අතර පසුව අදුරු කොළ පැහැයට හැරේ



බීත්තර



කීටයා

හානිය

ලෙටි කිරිසින් විසින් පත්‍ර සුටා කයි. වැඩුණු කිරිසින් විසින් කරල් වලට හානි සිදුකරයි

පුඹුවා



කුඹුරු

(*Aphis craccivora*)

විශේෂ ලක්ෂණ

මි.මි. 1-2 ක් පමණ දිග කළු පැහැති සතෙකි

හානිය

- ගහයේ පත්‍ර හා කඳ ප්‍රදේශයන් යුෂ උරා බීම නිසා විකෘති පත්‍ර හා කඳන් සහිත කුරු ගහ අග්‍රි වේ
- වසිරිස් රෝග පතුරුවා හරින වාහකයින් ලෙසද ක්‍රියා කරයි



හානිය

පත්‍ර කනින්නන්

(*Stompteryx subsecivella*)

විශේෂ ලක්ෂණ

සුනඹුලා මි.මි. 6 ක් පමණ දිග දුඹුරු අළු පැහැති සලබයෙකි



පුඹුවා

හානිය

කුඩා කිරිසින් පත්‍රයේ උමං භාරයි. නානිය වැඩි වූ විට පත්‍ර පිළිස්සුණු ස්වභාවයක් ගනී



හානිය